

UNDAMEECTINA®

UNDAMEECTINA®

INSECTICIDA - CONCENTRADO Registro Nacional ICA No. 0190
EMULSIONABLE. EC Titular del Registro: UNDAAGRO S.A.
VENTA POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente Activo:

Abamectina (grupo químico: Avermectinas):
Mezcla de avermectinas con mas de 80% de Avermectina B_{1a}
y menos de 20% de avermectina B_{1b}.....18 g/L

Ingredientes Aditivos:c.s.p. 1 Litro

LEA ESTE FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES:

UNDAMEECTINA® es altamente tóxico, por lo cual se recomienda observar todas las precauciones necesarias en el manejo y aplicación de estos plaguicidas.

SEGURIDAD PARA EL USUARIO:

- No ingerir, no inhalar la nube de aspersión y evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No se debe comer, beber ni fumar durante las aplicaciones.
- Lávese con abundante agua y jabón después de manipular y aplicar el producto.
- Lave la ropa contaminada antes de usarla de nuevo.
- Lave los equipos de aspersión con agua y detergente.
- Cuando se manipule el producto debe usarse ropa de trabajo, es decir, overoles sombrero o cachucha, botas y guantes.
- En caso de salpicaduras accidentales, inmediatamente lávese las partes afectadas.
- Después del trabajo cámbiense de ropa y lávese el cuerpo.

PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Traslade la persona contaminada al aire fresco. Si no respira, suminístrele respiración artificial, preferiblemente de boca a boca.

Ingestión: Dele inmediatamente uno o dos vasos de agua e induzca el vómito tocando suavemente el fondo de la garganta con un dedo u objeto sin afilar. No inducir el vómito, no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

Piel: Lávela con abundante agua y jabón.
Ojos: Enjuáguelos con abundante agua.

ANTÍDOTO

No existe antídoto específico. Aplique tratamiento sintomático.

Nota para el Médico: La intoxicación seguida por la ingestión accidental del producto, puede ser minimizada induciendo el vómito dentro de los 30 minutos después de la exposición. Si la toxicidad progresa hasta causar vómito severo, debe evaluarse el grado de desequilibrio electrolítico. Adminístre por vía parenteral el soporte hidroelectrolítico apropiado junto con otras medidas de soporte (tales como mantenimiento de la presión arterial), como lo indique los signos, síntomas y demás mediciones clínicas. En casos severos, se debe continuar observando al paciente por varios días hasta que la condición clínica sea estable y normal. Debido a que la Abamectina aumenta la actividad del ácido gamma-aminobutírico en animales, es prudente evitar drogas que aumenten la actividad de esta sustancia (barbitúricos, benzodiazepinas, ácido valproico) en pacientes con una toxicidad potencial por la exposición a la Abamectina.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta. EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono: (57) 1 288 6012.



Importado y Distribuido Por: UNDAAGRO S.A.
Tels: (571) 6 72 9777 - Fax: (571) 6 72 9808
Calle 162 No. 20 - 46 - Bogotá D.C. - Colombia

INDICACIONES GENERALES:

Utilícelos según las indicaciones UNDAAGRO® es efectiva en todos los estados móviles de los ácaros, UNDAAGRO® inmoviliza las plagas poco después de la exposición. La mortalidad máxima se alcanza entre tres y siete días. Durante este periodo, la alimentación y el daño a la planta son mínimos. UNDAAGRO® puede ser utilizado para tratamientos preventivos o curativos.

UNDAMEECTINA® ha sido ensayado por fitotoxicidad, en una amplia variedad de flores, plantas ornamentales. Sin embargo dado que todas las combinaciones o secuencias de aplicaciones de plaguicidas incluyendo surfactantes y adyuvantes aún no han sido ensayadas, se recomienda que primero sea fumigada un área pequeña para asegurarse que no se presente fitotoxicidad.

UNDAMEECTINA® es eficaz bajo un alto rango de temperaturas y puede ser mezclada con aguas de diferentes durezas y valores de pH normalmente encontrados en condiciones agrícolas. Mantenga la mezcla en agitación una vez que UNDAAGRO® sea mezclada con agua. La mezcla debe ser aplicada el mismo día, evite utilizar de un día para otro.

RECOMENDACIONES:

UNDAMEECTINA® debe ser utilizado tan pronto como los ácaros sean observados. Para el control, repita la aplicación cuando sea necesario hasta que los ácaros hayan sido controlados. Para un buen control es esencial un cubrimiento total y completo de todas las superficies de la planta y se debe calibrar bien los equipos.

AMBIENTE:

No contamine fuentes de agua con los sobrantes de la aspersión este producto es tóxico a peces.

El producto es altamente tóxico a las abejas, por lo tanto no se debe aplicar en épocas de floración de los cultivos.

- **Derrames:** recójalos con algún material absorbente (por ej. Aserrín), colóquelos en una bolsa plástica y deposítelos en un sitio adecuado (lejos de fuentes de agua, cultivos o zonas habitadas), y proceder de acuerdo a las regulaciones locales.

ALMACENAMIENTO

- Mantenga el producto en sus envases originales en un lugar seguro, seco y fresco. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

- No transporte ni almacene con productos de uso humano pecuario.

- Evite almacenar a temperaturas por encima de 35°C.

• Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

• Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación. Los envases, empaques o embalajes desocupados, deberán ser destruidos y dispuestos de acuerdo con la regulación local.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante Registro Oficial de Venta se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

UNDAMEECTINA® pertenece al grupo químico de las abamectinas y actúa por contacto e ingestión, además de tener acción translaminar. Es altamente efectivo en el control de ácaros y minadores.


INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES	P.C	P.R
FLORES Y ORNAMENTALES	Ácaros: (<i>Tetranychus spp.</i>). Minadores: (<i>Liriomyza spp.</i>).	25-50cc/100L de agua o 560-1500 cc/ha	Aplique cuando sea necesario hasta que la plaga haya sido controlada.	NO	1 día
ALGODON	Ácaros: (<i>Tetranychus spp.</i>).	300-600 cc/ha en 200L agua	Aplique cuando aparezca los primeros síntomas de daños por ácaros y repita si es necesario.	20 días	1 día
MELÓN	Ácaros: (<i>Tetranychus spp.</i>). Minadores: (<i>Liriomyza spp.</i>).	500-1000 cc/ha en 400 a 800L de agua	Aplique cuando sea necesario hasta que la plaga haya sido controlada.	3 días	1 día
TOMATE	Ácaros: (<i>Tetranychus spp.</i>). Minadores: (<i>Liriomyza spp.</i>). Cogollero: (<i>Tuta absoluta</i>)	500-1000 cc/ha	Aplique cuando sea necesario hasta que la plaga haya sido controlada.	3 días	1 día
CÍTRICOS	Ácaros (<i>Phyllocoptruta o leivora</i> , <i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	360-600 cc/ha	Aplique cuando sea necesario hasta que la plaga haya sido controlada.	7 días	1 día
CEBOLLA	Minador de tallo: (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	500-1000 cc/ha en 700L de agua	Aplique cuando sea necesario hasta que la plaga haya sido controlada.	3 días	1 día

P.C.: Período de carencia P.R.: Período de reentrada

COMPATIBILIDAD DE MEZCLAS DE TANQUE

UNDAMEECTINA® es compatible en mezcla de tanque con la mayoría de los insecticidas, acaricidas y fungicidas de uso corriente. No obstante es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
CUIDADO VENENO

